

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
151	Briichen 407				
<u>Knol vorm</u>				<u>Kookeigenschappen</u>	smaak
sortering				geur	vezel
schilkleur	geel			bloemigh.	kleur
vleeskleur				<u>Stengel</u>	aant.
ogen	aant.	verdeling		kleur	stevigh.
rustperiode				vleugels	stipulae
<u>Chem. samenst.</u>	19	19	19	19	19
O. W. G.				<u>Blad jukken</u>	stand
P ₂ O ₅ zetm.				stip	samenst.
Koolhydr.				beharing	dikte
R. E.				vorm blaadjes	tussenbl.
Vitamine C				opvulling bl. oppervlak	
Solanine				<u>Bloeiwijze</u>	periode
<u>Zetm. korrelvorm</u>		sortering		stengel	stipulae
<u>Resistentie</u>	Phytophthora	blad		<u>Bloem stengel</u>	geleding
	-	knol		diam.	vorm
Wratziekte	D	G		androec.	stijl
Fusarium		Rhizoctonia		stuifmeel	sp. bessen
Alternaria		Schurft		besvorm	aant. zaden
Bladrol		Virus X		<u>Kruisbaarheid</u>	
Virus S	Y	Mozaiek			
Aard. moeheid		Colorado kever			
Kringerigheid		inw. knolgebr.			
Vorst					

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
155	Brieka 412				

Knol vorm . *rond-w.*
 sortering
 schilkleur *diep. vlekkelig.*
 vleeskleur *geel*
 ogen *ing. diep.* aant. *matig* verdeling *voorn. ligg.*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringerigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
156 182	Krücher 414 409				

Knol vorm .. *brood* ..
 sortering ..
 schilkleur ..
 vleeskleur ..
 ogen .. aant. .. verdeling ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad ..
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia ..
 Alternaria .. Schurft ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. Colorado kever ..
 Kringrigheid .. inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak ..
 geur .. vezel ..
 bloemigh. kleur ..

Stengel aant. stevigh.
 kleur ..
 vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..
 stip .. samenst.
 beharing .. dikte ..
 vorm blaadjes .. tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..
 stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..
 diam. vorm .. kleur ..
 androec. stijl ..
 stuifmeel .. sp. bessen ..
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
157 = 152 lijkt op 150	Brucher 4/15 = 409				

Knol vorm
 sortering
 schilkleur
 vleeskleur
 ogen aant. verdeling

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
150	de benaming München 416				

Knol vorm .. *ronde knol* ..
 sortering ..
 schilkleur ..
 vleeskleur *geel* ..
 ogen *op vlak* .. aant. .. verdeling ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ..
 P₂O₅ zetm. ..
 Koolhydr. ..
 R. E. ..
 Vitamine C ..
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad ..
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia ..
 Alternaria .. Schurft ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. Colorado kever ..
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ..
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..
 geur .. vezel ..
 bloemigh. .. kleur ..

Stengel aant. .. stevigh. ..
 kleur ..
 vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..
 stip .. samenst. ..
 beharing .. dikte ..
 vorm blaadjes .. tussenbl. ..
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloetwijze .. periode ..
 stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..
 diam. .. vorm .. kleur ..
 androec. .. stijl ..
 stuifmeel .. sp. bessen ..
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
159	Porriëkes 417				
<u>Knol vorm</u>	.. rond.
sortering
schilkleur	.. geel
vleeskleur	.. geel
ogen	.. een diep. aant.
rustperiode
<u>Chem. samenst.</u>	19	19	19	19	19
O. W. G.
P ₂ O ₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine
<u>Zetm. korrelvorm</u>
<u>Resistentie</u>	Phytophthora	blad
	-	knol
Wratziekte	D	..	G
Fusarium	Rhizoctonia
Alternaria	Schurft
Bladrol	Virus X
Virus S	..	Y	..	Mozaiek	..
Aard. moeheid	Colorado kever	..
Kringerigheid	inw. knolgebr.	..
Vorst

<u>Kookeigenschappen</u>	smaak	..
geur	..	vezel
bloemigh.	..	kleur
<u>Stengel aant.</u>	..	stevigh.
kleur
vleugels	..	stipulae
<u>Blad jukken</u>	..	stand
stip	..	samenst.
beharig	..	dikte
vorm blaadjes	..	tussenbl.
opvulling bl. oppervlak
<u>Bloeiwijze</u>	..	periode
stengel	..	stipulae
<u>Bloem stengel</u>	..	geleding
diam.	..	vorm
androec.	..	stijl
stuifmeel	..	sp. bessen
besvorm	..	aant. zaden
<u>Kruisbaarheid</u>

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
160	Bancker 410				

Knol vorm rond
 sortering
 schilkleur grote vlekke. paars. & geel. schap. onrijp.
 vleeskleur
 ogen aant. verdeling
 rustperiode
Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine
Zetm. korrelvorm sortering
Resistentie Phytophthora blad
 - knol
 Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae
Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak
Bloeiwijze periode
 stengel stipulae
Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden
Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
1601	Bn. 419				

Knol vorm . *ovaal afgeplat*
 sortering
 schilkleur . . *peel*
 vleeskleur . . *geel*
 ogen . . *vlak* aant. *matig* verdeling . *top en de*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
162	<i>Buicken 421</i>				

Knol vorm
 sortering
 schilkleur
 vleeskleur
 ogen aant. verdeling
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloetwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
166	de benaming Cantha 1	Cantha vallei ± 3000 m 12/13			

Knol vorm .. rond. iets. plat.
 sortering
 schilkleur .. basis. rood paars. geel. vlakken. top. geel. paars.
 vleeskleur
 ogen .. drupp. aant. .. matig. verdeling. vrij. verspreid
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia ?

Alternaria Schurft ?

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid .. Sabras. Colorado kever

Kringerigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharig. dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden.

Kruisbaarheid

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

by m. transt.

Nummer 168 verzameld onder de benaming *Pantka 3* Groeiplaats inheemse naam Solanum 2n=

Knol vorm . *ronde, ovaal*
 sortering . *goed*
 schilkleur . *geel met heel licht paars aan de zijkanten*
 vleeskleur . *blg*
 ogen . *veel* . aant. . *veel* . verdeling . *veel*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. *250*
4.27
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad *veel*
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia 0
 Alternaria Schurft *veel*
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid . *nat hoar* Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

by. ontv. S. geen X, Y en bladrol

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
'170	de benaming	Cantha vallei			
	Cantha 5				

Knol vorm . rond. tot ov. don. diepe gfr.
 sortering matig.....
 schilkleur blauw paars. i. d. donkerder i. de gfr.
 vleeskleur zwart. wit.....
 ogen diep..... aant. matig... verdeling. goed verspreid
 rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
 O. W. G. 30.0?
 P₂O₅ zetm. 0.25
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering.....

Resistentie Phytophthora blad.....
 - knol.....

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia o.
 Alternaria Schurft i. d.
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid ... na A. baan Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae.....

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode.....
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding.....
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden.....

Kruisbaarheid *S. tuberosum* *C. batatas*

by. ontroepst. gea. x. s. x. e. bl. v. d.

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
172 = 167	de benaming Cantha 7 = 2	Cantha valle			

Knol vorm .. rond, oval ..
 sortering .. matig ..
 schilkleur ..
 vleeskleur ..
 ogen .. diep .. aant. matig .. verdeling .. vrom. top ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
 O. W. G. .. 227 ..
 P₂O₅ zetm. .. 0.26 ..
 Koolhydr. ..
 R. E. ..
 Vitamine C ..
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad. veel ..
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia 0 ..
 Alternaria .. Schurft 0 ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. water .. Colorado kever ..
 Kringerigheid .. inw. knolgebr. ..
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..
 geur .. vezel ..
 bloemigh. .. kleur ..
Stengel aant. .. stevigh. ..
 kleur ..
 vleugels .. stipulae ..
Blad jukken .. stand .. kleur ..
 stip .. samenst. ..
 beharing .. dikte ..
 vorm blaadjes .. tussenbl. ..
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..
 stengel .. stipulae ..
Bloem stengel .. geleding ..
 diam. .. vorm .. kleur ..
 androec. .. stijl ..
 stuifmeel .. sp. bessen ..
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..
 ..
 ..
 ..
 ..

leg. n.v. v. S. gen. X. f. blad.

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
173	de benaming <i>Panthea</i>	<i>Panthea valleri</i>			

Knol vorm .. rond .. iets afgeplat .. in de lengte ..
 sortering .. matig ..
 schilkleur .. geel .. soms paarse vlekken .. top .. of .. spruite .. of .. geel .. of .. paars ..
 vleeskleur .. geel ..
 ogen .. n.g. diep .. aant. .. matig .. verdeling .. n.g. verspreid ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G. .. 293 ..
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm sortering ..

Resistentie .. Phytophthora blad
 - .. knol

Wratziekte .. D G
 Fusarium Rhizoctonia ..
 Alternaria Schurft ..
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek ..
 Aard. moeheid Colorado kever ..
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen .. smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by ontv. S .. per. X. Y. Oerol ..

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
174 sept '07 171	Cantha 9	Cantha valler			

Knol vorm rond.....
 sortering matig.....
 schilkleur dr. blauw paars... stengelend. soms iets groen...
 vleeskleur rlg.....
 ogen by diep. aant. matig. verdeling vooraf keap.
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G. 49.5?
 P₂O₅ zetm. 0.27
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad.....
 - knol.....

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia Q
 Alternaria Schurft .o
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid ... matvaan Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh..... kleur

Stengel aant. stevigh.....
 kleur
 vleugels stipulae.....

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam..... vorm..... kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden.....

Kruisbaarheid

by ontvangst S.? ... fev. X.Y. blad.

Nummer 175 verzameld onder de benaming Cartha 10
 Groeiplaats inheemse naam Solanum goniocalyx 2n= 24

Knol vorm
 sortering
 schilkleur
 vleeskleur
 ogen aant. verdeling
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm. 0,2%
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia *o*
 Alternaria Schurft *o*
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringerigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae
Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

bij ontvangst X Y S blad

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
179	Cantha 14	Panthe valle			

Knol vorm .. rond ..
 sortering .. ? ..
 schilkleur .. geel-roosig ..
 vleeskleur .. geel ..
 ogen .. by diep .. aant. .. matig .. verdeling .. vanad. lopp. ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering ..

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid .. watboer Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by uitwast X.S. ... for Y. blol

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
181	Cantha 16	Cantha valle			

Knol vorm . rond - oval
 sortering . mossi
 schilkleur . donker bruinpaars met scherp begrensd gele vleesje
 vleeskleur . geel - geel
 ogen . by driep . aant . matig verdeling . vooral top
 rustperiode

Chem. samenst. 19 1996 19 19 19 19

O. W. G. ³⁸³
 P₂O₅ zetm. ⁴⁵⁵
 Koolhydr. ^(1978 surr.)
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia o
 Alternaria Schurft. i. h
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid pat. baas Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

by ontv. van X. S. Y. & bl. v. l.

Kookeigenschappen smaak

geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharig dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
182	Cartha 17	Cartha vallei			

Knol vorm .. Rond ..
 sortering .. kleine knolletjes ..
 schilkleur .. geel. met paars. was .. ofon iets paars ..
 vleeskleur .. wit ..
 ogen .. by diep .. aant. .. matig .. verdeling .. vromal. top ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm sortering ..

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by ontvangst. see X. S. Y. e. blad

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
183	Cantha w	Cantha valler			

Knol vorm *ovaal*
 sortering *?*
 schilkleur *dypaars*
 vleeskleur *wit*
 ogen *by vlak. aant. matig* verdeling *vooral top*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
 O. W. G. *350*
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie *Phytophthora blad. web*
 - *knol*

Wratziekte *D* *G*
 Fusarium *Rhizoctonia*
 Alternaria *Schurft*
 Bladrol *Virus X*
 Virus S *Y* *Mozaiek*
 Aard. moeheid *natbaar* *Colorado kever*
 Kringrigheid *inw. knolgebr.*
 Vorst

by ontroepst. X en S gee X e blol

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
184	Pantka 19	Pantka vollen			

Knol vorm . rond
 sortering
 schilkleur . . geel. maer
 vleeskleur . . geel
 ogen diep. aant. matig. verdeling normaal top
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia . a
 Alternaria Schurft . o
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid watloos Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

by ontvangst. ja X. Y. S. e. bladrol

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae
Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
185 lijed op 201	Casablanca / lijed op Tarma 10 b				

Knol vorm . langwerpig
 sortering . vrij foer
 schilkleur . geel . seers . grote . f.
 vleeskleur . geel
 ogen . vrij stab.
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G. 363
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm
Resistentie Phytophthora blad
 - knol
 Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae
Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae
Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by ontvangst. gee X . Y . S . of . Kadruel .

Nummer 186
 = 196

verzameld onder de benaming Casablanca 2
 = Tarma 6

Groeiplaats Hacienda Casablanca

inheemse naam

Solanum

2n = 24 sluis dans een perigon aantal

Knol vorm kant-vraak. onregelmatig.
 sortering Slecht.
 schilkleur roodpaars.
 vleeskleur geel.
 ogen bij diep. aant. bij veel. verdeling verspreid
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. 85.7
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad veel.
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia o.
 Alternaria Schurft o.
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid nat. l. o. v. Colorado kever
 Kringrigheid pe inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

bij vrucht. gee x. s. y. en bladrol

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
187 = 194	Casablanca 2 = Parma 7	Hacienda Casablanca 4100 m. 12° 15'	'Lily'		

Knol vorm . land. - vrucht. - meelknol.
sortering . vry. gaed.
schilkleur . donker bruin.
vleeskleur . wit.
ogen . diep. aant. . groot. verdeling . heel verspreid
rustperiode .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. 387
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad.
. knol.

Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia
Alternaria Schurft
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid Colorado kever
Kringerigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
. geur vezel
. bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
. kleur
. vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
. stip samenst.
. beharing dikte
. vorm blaadjes tussenbl.
. opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
. stengel stipulae

Bloem stengel geleding
. diam. vorm kleur
. androec. stijl
. stuifmeel sp. bessen
. besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid
.
.
.
.
.
.

By ontvangst. geen X-S-Y en bladrol

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
180 = 109	Casablanca y ^a 4b	hacienda Casablanca 4100 m 12° 15'			

Knol vorm Ronk: iets. vlak. zichtl. stengel. top.
 sortering matig.
 schilkleur groen. met. paars. over de in de. gfan.
 vleeskleur geel.
 ogen. by diep. aant. metig. verdeling. vooral. kop.
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G. 306.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad weinig.
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia 0
 Alternaria Schurft 0
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by onlangs. per X. S. Y. e. fl. v. l.

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
189 = 100	Casablanca 46	Lacienda Casablanca 4100 m 12° 21' B			

Knol vorm . rond, iets plat. dikking. stengel-top
sortering . matig
schilkleur . geel. met paars in en om de ogen
vleeskleur . l. geel
ogen . bij diep. aant. matig verdeling . rond. top
rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
O. W. G. 400
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad *lesemij.*
. - knol

Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia . a
Alternaria Schurft . a
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid Colorado kever
Kringerigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
. geur vezel
. bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
. kleur
. vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
. stip samenst.
. beharing dikte
. vorm blaadjes tussenbl.
. opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
. stengel stipulae

Bloem stengel geleding
. diam. vorm kleur
. androec. stijl
. stuifmeel sp. bessen
. besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid
.
.
.
.
.
.
.
.
.

by uitkrangt. gee X.S.Y. a Bladrol

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
196 =186	Tarma 6 = Casablanca?	hae. Casablanca 4000 m 12° LB	"Colorado"		

Knol vorm . . . langwerpig . . . ovaal
sortering matig
schilkleur paarsrood
vleeskleur l. geel
ogen bij diep aant. bij. v. v. verdeling een v. v.
rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. 3.6
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
. - knol

Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia
Alternaria Schurft
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid watbaan Colorado kever
Kringrigheid inw. knolgebr.
Vorst

by ontv. angot. hout. jaen X. S. X. of Bladrol

Kookeigenschappen smaak
. geur vezel
. bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
. kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
. stip samenst.
. beharing dikte
. vorm blaadjes tussenbl.
. opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

. stengel stipulae

Bloem stengel geleding
. diam. vorm kleur
. androec. stijl
. stuifmeel sp. bessen
. besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
190	de benaming	loc. Casablanca	"Chate Blanca"		
	Farma D	4100 m			
		1200 m			

Knol vorm . rond. vaak. iets. flat. met by. steif. top.
 sortering . been. moed.
 schilkleur . geel. soms. paarsig. by de ogen (van v. l. l. l. l.)
 vleeskleur . geel.
 ogen . by diep. aant. . matig. . verdeling . rond. top.
 rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
 O. W. G. 207
 P₂O₅ zetm. 0.25
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Nat. van Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by. ontv. ang. f. van. ant. wa. sch.

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
199	de benaming Tarma 9	hae. Casablanca 4100 m 12° 21' N	Lushuito Blanca		

Knol vorm . rond
 sortering . ?
 schilkleur . geel. of. rose. geel.
 vleeskleur . wit
 ogen . bij. driep. . aant.
 rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm. 0.25
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad. veel
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia bij. veel
 Alternaria Schurft a
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

by. onkruid. geen X. S. Y. + knol

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
200	Stamma 10 ^a	hae. Casablanca 4100 m 12° 20'	shuito rosada		

Knol vorm *ovaal langwerpig*
 sortering *moor*
 schilkleur *paars-wit*
 vleeskleur *bruin*
 ogen *wij. vlak* aant. *matig* verdeling *in verspreid*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie *Phytophthora* blad
 knol

Wratziekte *D* *G*
 Fusarium *Rhizoctonia*
 Alternaria *Schurft*
 Bladrol *Virus X*
 Virus *S* *Y* *Mozaiek*
 Aard. moeheid *Colorado kever*
 Kringrigheid *inw. knolgebr.*
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by ontvangst 10 X virus jaar X.S. e. Olatool