

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
252	de benaming Kearia 13		Cocoe Sullu		

Knol vorm .. rond .. iets afgeplat. of stanglemad ..
 sortering .. n.o.w.
 schilkleur .. geel ..
 vleeskleur .. donkergeel ..
 ogen .. diep .. aant. .. onafg. .. verdeling .. van el. lops.
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. .. 39.0.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm sortering ..

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G ..
 Fusarium Rhizoctonia *ies* ..
 Alternaria Schurft *ies* ..
 Bladrol Virus X ..
 Virus S Y Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. *vetbaan* Colorado kever ..
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
 kleur stolone ..
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by ontv. angst. geen onderzoek.

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	Zn=
253	de benaming Keaia 14		Yana maccha		

Knol vorm . rond . afgeplat . naveloed . navel diep
 sortering
 schilkleur . donker bruin
 vleeskleur . bruin
 ogen . diep aant malig verdeling
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae
Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

By ontvangst bart. zwak X. see 5. X bl. w. l.

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
254	de benaming Kcaia 15-		Yurac anca		

Knol vorm . smol. iets plat. naverleid. (knovel met diep.)
 sortering . matig
 schilkleur . donker paars
 vleeskleur . geel . sours . paars . mat. beesteling
 ogen . diep aant. matig verdeling smol. top
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. 39 b
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia . a
 Alternaria Schurft . iets
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid walt Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

ley m. tr. amp. see anderswel

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
255 = 249	Kecua 16 } = 10 }	volgens Ocha van de land K. 10 van land 1. 20 x k. 16	Alea quehuilla andigenus uit e schale schale vol mel		

Knol vorm
 sortering
 schilkleur
 vleeskleur
 ogen aant. verdeling
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19⁵⁶ 19 19 19 19
 O. W. G. 39.3(2)
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia *sch*
 Alternaria Schurft *sch*
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by ontvangst. geen onderzoek

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
256	de benaming Kaua 17		Canth 15		

Knol vorm . *ronde*
 sortering
 schilkleur . *bruin van met gele vlekken*
 vleeskleur . *bruin wit*
 ogen aant. *matig* verdeling . *in oorsprong*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft . *vb*
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid . *natuur* Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
257	de benaming Kecua W		Yana mattoe	genuicoly? ?	

Knol vorm . la. juncusrij. uit. d. d.
 sortering
 schilkleur . geel
 vleeskleur . geel
 ogen diep. lange. aant. veel verdeling
omalle spleten
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by de hand van onderzoek

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
258	de benaming Kearia 20		Puli		

Knol vorm *plataraal*

sortering *goed*

schilkleur *paarsrood*

vleeskleur *geel - d. paars*

ogen *vlak* ... aant. *weinig* .. verdeling *small. lip*

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D

Fusarium

Alternaria

Bladrol

Virus S

Aard. moeheid *natloos*

Kringerigheid

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur

bloemigh.

Stengel aant.

kleur

vleugels

Blad jukken

stand

stip

behaving

vorm blaadjes

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze

periode

stengel

Bloem stengel

geleding

diam.

androec.

stuifmeel

besvorm

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
259	de benaming Keara 21		Cardovina		

Knol vorm ..Roedl.....
 sortering moon.....
 schilkleur geel.....
 vleeskleur ..geel.....
 ogen .vy. diep .. aant. matig .. verdeling .. vy. verdelid.
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. 337 (kw).....
 P₂O₅ zetm. 0.30.....
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C

Zetm. korrelvorm .. sorterings ..

Resistentie Phytophthora blad ..
 - knol

Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia ..
 Alternaria .. Schurft ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. pat. Hoar .. Colorado kever ..
 Kringrigheid .. inw. knolgebr.
 Vorst

... geel. anderswel by ontwaasol

Kookeigenschappen smaak ..
 geur .. vezel ..
 bloemigh. kleur ..

Stengel aant. stevigh.
 kleur ..
 vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..
 stip .. samenst.
 beharing .. dikte ..
 vorm blaadjes .. tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..
 stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..
 diam. vorm .. kleur ..
 androec. stijl ..
 stuifmeel .. sp. bessen ..
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
260	de benaming Kearia 22		Aeo Huayacca		

Knol vorm . Rond
 sortering
 schilkleur
 vleeskleur
 ogen aant. verdeling
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by mtica pl. gen virus onderzoek.

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
261 = 246? = 250 = 260	Kearia 23 = 11 = 0?		<i>Compis</i>		

Knol vorm

sortering

schilkleur

vleeskleur

ogen aant. verdeling

rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G. 363

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia

Alternaria Schurft *iets*

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid ... *valboer* Colorado kever

Kringrigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleiding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by ontvangst X ges. S. X. of bladrol

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
262	de benaming Kecua 24		suncho		

Knol vorm .. rond .. iet. flat navet in de .. navet iet. wijenoden
 sortering .. mrova ..
 schilkleur .. geel ..
 vleeskleur .. donker geel ..
 ogen .. by. diep .. aant. .. maly .. verdeling .. rond. lopp. ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. .. 3.63 ..
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad ..
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia .4 ..
 Alternaria .. Schurft by veel ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. wat Boer .. Colorado kever ..
 Kringrigheid .. inw. knolgebr.
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..
 geur .. vezel ..
 bloemigh. kleur ..

Stengel aant. .. stevigh.
 kleur ..
 vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..
 stip .. samenst.
 beharing .. dikte ..
 vorm blaadjes .. tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..
 stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleiding ..
 diam. vorm .. kleur ..
 androec. stijl ..
 stuifmeel .. sp. bessen ..
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..

by ontvrijd see andersoel ..

Nummer 263 verzameld onder de benaming *Kearia 25* Groeiplaats inheemse naam *Yane Tayani* Solanum 2n=

Knol vorm . *vrucht. naar v. bij. plat. (s. knop. tips.)*
 sortering
 schilkleur *donker paars*
 vleeskleur *bruin wit*
 ogen *diep* aant. *weinig* verdeling *naar v. bij.*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G. *a*
 P₂O₅ zetm. *0.29*
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering
Resistentie Phytophthora blad *veel*
 - knol
 Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia *a*
 Alternaria Schurft *a*
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid ... *part. boer* ... Colorado kever
 Kringerigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae
Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae
Bloem stengel geleiding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

bij ontwaart part. X. S. en Y. geen bladrol

Nummer 264 verzameld onder de benaming Keaia 26
 Groeiplaats inheemse naam Solanum 2n=
 Pullpa chinac

Knol vorm
 sortering
 schilkleur geel. bross. deors. deors.
 vleeskleur
 ogen aant. verdeling
 rustperiode
Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine
Zetm. korrelvorm sortering
Resistentie Phytophthora blad
 - knol
 Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae
Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak
Bloeiwijze periode
 stengel stipulae
Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden
Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
266	de benaming Kecai a 20		Huamanuma		

Knol vorm rood. wat loefij.
 sortering .. m...
 schilkleur .. paars rood
 vleeskleur 2. donker. geel
 ogen diep. aant. verdeling.
 rustperiode .. spruit.

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. 379
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia D
 Alternaria Schurft a
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid .. vatbaar Colorado kever
 Kringerigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by ontvangst. komt X en Y. S en Redrol.

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
267	de benaming Kearia 29		Ofrenda		

Knol vorm blad. gedeeltes van de knol
 sortering
 schilkleur
 vleeskleur
 ogen aant. verdeling
 rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
 O. W. G. 301
 P₂O₅ zetm. 0.20
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by ontv. van een virus. onderzoek

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
$\frac{260}{= 240?}$ = 250 = 261	Kearia 30 = 25 = 26?		<i>Blama mahui</i>		

<u>Knol vorm</u>				
sortering				
schilkleur				
vleeskleur				
ogen	aant.	verdeling		
rustperiode				
<u>Chem. samenst.</u>	19	19	19	19	19
O. W. G.	372.....				
P ₂ O ₅ zetm.				
Koolhydr.				
R. E.				
Vitamine C				
Solanine				
<u>Zetm. korrelvorm</u>	sortering			
<u>Resistentie</u>	Phytophthora blad <i>ly. uel.</i>				
	- knol.....				
Wratziekte	D	G		
Fusarium	Rhizoctonia			
Alternaria	Schurft <i>ly. uel.</i>			
Bladrol	Virus X			
Virus S	Y	Mozaiek		
Aard. moeheid	Colorado kever			
Kringerigheid	inw. knolgebr.			
Vorst				

<u>Kookeigenschappen</u>	smaak
geur	vezel
bloemigh.	kleur
<u>Stengel aant.</u>	stevigh.
kleur	
vleugels	stipulae
<u>Blad jukken</u>	stand	kleur
stip	samenst.
beharing	dikte
vorm blaadjes	tussenbl.
opvulling bl. oppervlak	
<u>Bloeiwijze</u>	periode
stengel	stipulae
<u>Bloem stengel</u>	geleding
diam.	vorm	kleur
androec.	stijl
stuifmeel	sp. bessen
besvorm	aant. zaden
<u>Kruisbaarheid</u>	

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
269	de benaming Kcaia 31		<i>Yrae quequerami</i>		

Knol vorm . rond. iets. r. d. l. sp. aff. plat.
 sortering moo.
 schilkleur de v. i. l. e. t.
 vleeskleur geel.
 ogen w. g. d. i. s. aant. w. i. j. v. e. e. l. verdeling v. o. n. a. l. t. o. p.
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G. 330 hd
 P₂O₅ zetm. 0.50
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad v. e. e. l.
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia a
 Alternaria Schurft i. e. t. s.
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid w. a. t. b. o. a. n. Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

By aankomst bent S. e. Y. ge X blrol.

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
270	de benaming Kearia 32		Kuntur Runtu		

Knol vorm . rood. hoekig
 sortering goed
 schilkleur geel
 vleeskleur wit
 ogen diep aant. matig verdeling vert. 2/3 lopp.
 rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
 O. W. G. 315
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid matig Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by nativa-jol fee vinnis and so on

Nummer

verzameld onder
de benaming

Groeiplaats

inheemse naam

Solanum

2n=

271

Keara 33

Socco chinacui

Knol vorm *Oraal*

sortering ..?

schilkleur *dpaar. met gele vlekken*

vleeskleur *wit*

ogen .. *vlek*... aant. *lg. weinig*. verdeling *verspreid*...

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad *pub.*

- knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia

Alternaria Schurft

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid Colorado kever

Kringerigheid inw. knolgebr.

Vorst

lg. verwant met X.S.Y. zie bladrol

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
272	de benaming Kearia 34		Canario amarillo		

Knol vorm ..traal. vry diek. by de bl. sp. afgeplaf.
 sortering ..vry. goeie ..
 schilkleur ..groen ..
 vleeskleur ..geel ..
 ogen ..vry. diep. .. aant. .. vry. veel. .. verdeling .. vry. verspreid ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. 266 ..
 P₂O₅ zetm. 220 ..
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C ..
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm sortering ..

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G ..
 Fusarium Rhizoctonia *ich.* ..
 Alternaria Schurft *veel* ..
 Bladrol Virus X ..
 Virus S Y Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. *part. h. o. v.* Colorado kever ..
 Kringerigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by ontvangst ges. vinnig onderzocht

Nummer 273 verzameld onder de benaming Kacina 35 Groeiplaats inheemse naam Heay karumi Solanum 2n=

Knol vorm . langwerpig, wat onregelmatig
 sortering . v. goed
 schilkleur . zw.
 vleeskleur . geel
 ogen . v. diep . aant. . weinig . verdeling . ^{voorn.} ^{aan de top}
 rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
 O. W. G. 3.39/4)
 P₂O₅ zetm. 0.24
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia *ib.*

Alternaria Schurft *ib.*

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid *matlaas* Colorado kever

Kringerigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

By mlva. pl. ge. virus. kont. X. S. Y. ge. Kadrol

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
274	de benaming Kcaia 36		Maco 200		

Knol vorm .. *ovaal, ietsje plat* ..
 sortering .. *mo.v.* ..
 schilkleur .. *geel met paars om de zijkant* ..
 vleeskleur .. *geel-geel* ..
 ogen *lang vlak, vrij diep*, aant. .. *met* .. verdeling .. *ronde top* ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
 O. W. G. .. *40.2* ..
 P₂O₅ zetm. ..
 Koolhydr. ..
 R. E. ..
 Vitamine C ..
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm sortering ..

Resistentie .. Phytophthora blad
 knol

Wratziekte .. D G ..
 Fusarium Rhizoctonia ..
 Alternaria Schurft ..
 Bladrol Virus X ..
 Virus S Y Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. *pattoas* Colorado kever ..
 Kringrigheid inw. knolgebr. ..
 Vorst

Kookeigenschappen .. smaak
 vezel
 kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by overzigt. boel. S. see X. Y. - bladrol

Nummer 275 verzameld onder de benaming Kcaia 37 Groeiplaats inheemse naam Juncu Solanum 2n=

Knol vorm . Dorsal
sortering ?
schilkleur . l.p. aano. v. lekkij
vleeskleur . f. e. b.
ogen . l. v. v. l. b. : aant. m. a. h. y verdeling . w. o. n. a. l. t. o. p
rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
O. W. G. 4 (0.25)
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
- knol

Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia . 0
Alternaria Schurft i. e. b.
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid w. a. t. h. e. a. n Colorado kever
Kringrigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
geur vezel
bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
kleur
vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
stip samenst.
beharig dikte
vorm blaadjes tussenbl.
opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
stengel stipulae

Bloem stengel geleding
diam. vorm kleur
androec. stijl
stuifmeel sp. bessen
besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

By. v. t. a. p. o. l. b. o. n. t. S. Y. f. e. X e K. v. l.

Nummer 276	verzameld onder de benaming Kearia 38	Groeiplaats	inheemse naam Veteada	Solanum	2n=
---------------	---------------------------------------------	-------------	--------------------------	---------	-----

Knol vorm .. rond. v. w. o. o. l. i. e. t. s. a. p. p. l. a. d. l. e. y. t. i. e. s.
 sortering
 schilkleur .. rose. paars. met. veel. d. f. an. g. e. l. e. n. a. l. t. i. d. r. o. s. e. g. e. n
 vleeskleur .. geel
 ogen .. diep. .. aant. .. matig. .. verdeling. .. w. g. v. e. r. s. p. r. e. e. d
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. 34.9
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia *in*
 Alternaria Schurft *o*
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid .. *na. v. hoar.* Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae
Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by ontvangst X. S. Jan X. Bladrol

Nummer

verzameld onder
de benaming

Groeiplaats

inheemse naam

Solanum

2n=

277

Kcaina 39

Chata blanca

Knol vorm .. *brood. 2y. deling. plant* ..
 sortering .. *ny. foed.* ..
 schilkleur .. *geel.* ..
 vleeskleur .. *geel. peil.* ..
 ogen .. *ny. diep.* .. aant. .. *matig* .. verdeling *voor. top.* ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. .. *39. 3 (kd)* ..
 P₂O₅ zetm. .. *0.25 (l)* ..
 Koolhydr. ..
 R. E. ..
 Vitamine C ..
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm sortering ..

Resistentie .. Phytophthora blad
 - .. knol

Wratziekte .. D G ..
 Fusarium Rhizoctonia *ict.* ..
 Alternaria Schurft *o.* ..
 Bladrol Virus X ..
 Virus S Y Mozaiek ..
 Aard. moeheid Colorado kever ..
 Kringrigheid inw. knolgebr. ..
 Vorst

Kookeigenschappen .. smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by. ontvangt een virus onderzoek

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	Zn=
270	de benaming Kearia 41		Riesco		

Knol vorm . rond
 sortering
 schilkleur
 vleeskleur
 ogen
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae
Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae
Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by uitbrengst per virus onderzoek

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
279	Kearia 42	Cantha	Cantha		

Knol vorm . Rond . navel . w. diep . afgeplat
sortering . goed
schilkleur . geel
vleeskleur . l. geel
ogen . diep aant. . w. veel verdeling . w. verspreid
rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G. 200
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia . 0
Alternaria Schurft . 100
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid part. b. a. a. n Colorado kever
Kringerigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by ontvangt geen virus onderzoek

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
200	Kecir an 40 a		-		

Knol vorm . langwerpige . m...
 sortering . m...
 schilkleur . geel . met paars roze . om de zijkant
 vleeskleur . wit .
 ogen . bij v.l. . aant. . matig . verdeling . verspreid
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. 3.65
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleiding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by ontvangst van virus ont.

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
201	Kecua 436		-		

Knol vorm . rond . iets afgeplat . 2/3 delings . a. b. c. .
 sortering matig
 schilkleur geel . bross . paarsige . ^{vage vlekken}
 vleeskleur lozeel
 ogen ^{by deep} _{by vlak} aant. matig verdeling wond . loze .
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia ^{8. by veel}
 Alternaria Schurft . ^{iets}
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by. metraangt see virus out.

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
282	de benaming Kocain 45		Yurac Larma		

Knol vorm .. rond .. navel diep .. navel d. plat .. kleine
 sortering .. f. ede ..
 schilkleur .. paarsviolett. met pb. vlekken .. vooral om de ope
 vleeskleur .. wit. wat ..
 ogen .. aant. .. nabij .. verdeling .. bij verspreid
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. .. 2.66 d^v ..
 P₂O₅ zetm. .. 0.29 ..
 Koolhydr. ..
 R. E. ..
 Vitamine C ..
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad ..
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia ..
 Alternaria .. Schurft ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. mat. baas .. Colorado kever ..
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ..
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..

geur .. vezel ..

bloemigh. .. kleur ..

Stengel aant. .. stevigh. ..

kleur ..

vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..

stip .. samenst. ..

beharing .. dikte ..

vorm blaadjes .. tussenbl. ..

opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..

stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..

diam. .. vorm .. kleur ..

androec. .. stijl ..

stuifmeel .. sp. bessen ..

besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..

bij ontangst per vinn over
 1/2 mg veel bonje

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
283	de benaming Kceira 46		kaul queta (Chino, amarga)		

Knol vorm .. rond-ov. adl. .. afgeplat. r. knol ..
 sortering ..
 schilkleur .. geel. met. zw. o. k. paas. doorschijnend ..
 vleeskleur .. wit ..
 ogen .. diep .. aant. .. veel .. verdeling .. verspreid ..
 rustperiode ..
 lange, scherp. v. d. b. v.

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G. .. 40% k. d. /
 P₂O₅ zetm. ..
 Koolhydr. ..
 R. E. ..
 Vitamine C ..
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm sortering ..

Resistentie Phytophthora blad ..
 - knol ..

Wratziekte D G ..
 Fusarium Rhizoctonia D ..
 Alternaria Schurft O ..
 Bladrol Virus X ..
 Virus S Y Mozaiek ..
 Aard. moeheid p. a. b. a. a. .. Colorado kever ..
 Kringrigheid inw. knolgebr. ..
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..
 geur vezel ..
 bloemigh. kleur ..

Stengel aant. stevigh. ..
 kleur ..
 vleugels stipulae ..

Blad jukken stand kleur ..
 stip samenst. ..
 beharing dikte ..
 vorm blaadjes tussenbl. ..
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze periode ..
 stengel stipulae ..

Bloem stengel geleding ..
 diam. vorm kleur ..
 androec. stijl ..
 stuifmeel sp. bessen ..
 besvorm aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..

by ontbrengt see crinis matanoch

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
204	Keoria 47		Ppaltina		

Knol vorm *ovaal. met een top. dan basis. puntig.*
 sortering *ny. goed.*
 schilkleur *paars rood*
 vleeskleur *lichtgeel*
 ogen *ny. vlak* .. aant. *ny. veel* .. verdeling *verdeel.*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
 O. W. G. *27.04*
 P₂O₅ zetm. *0.25*
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia *wh*
 Alternaria Schurft *etyp.*
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid *nat. bo. en* Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae
Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleiding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by ontvamping van andere w.

Nummer

verzameld onder
de benaming
Kenia 48

Groeiplaats

inheemse naam
Cachua

Solanum

2n=

205

Knol vorm . *ruud.*
 sortering
 schilkleur . *feel. donk. in de kop.*
 vleeskleur . *feel.*
 ogen . *ly. vlak.* aant. *matig.* verdeling . *normal top.*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia *ist.*
 Alternaria Schurft . *4*
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid . . *patboer.* Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by ontv. opt. see virus antewach.

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
286	de benaming Kenia 49		Yana cherus pinco		

Knol vorm .. rond. koekje ..
 sortering .. goed. mooi ..
 schilkleur .. d. violet ..
 vleeskleur .. z. geel ..
 ogen .. ^{diep} .. aant. .. ^{matig} .. verdeling .. ^{in verspreid} ..
^{schape wandel}
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G. 312 (k) ..
 P₂O₅ zetm. 0.26 ..
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C ..
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm sortering ..

Resistentie .. Phytophthora blad. ^{beel} ..
 - .. knol ..

Wratziekte .. D G ..
 Fusarium Rhizoctonia ^o ..
 Alternaria Schurft ^{ich} ..
 Bladrol Virus X ..
 Virus S Y Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. ^{v.a.t. haas} Colorado kever ..
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen .. smaak ..
 geur vezel ..
 bloemigh. kleur ..

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae ..

Blad jukken stand kleur ..
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur ..
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by ontvangt. bawl Y. gee X 5 = blowl

Nummer *207* verzameld onder *Kaasia 50* Groeiplaats inheemse naam *Yurac maetacha* Solanum 2n=

Knol vorm *rand-ovaal*
 sortering *faat*
 schilkleur *geel med. d. violette vlekjes vooral top*
 vleeskleur *2 gele*
 ogen *by diep* aant. *matig* verdeling *vooral top*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia *o*
 Alternaria Schurft *wb*
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid *walboer* Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

leg ontvankelijk voor onderzoek

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
288	de benaming Kcaia 51		Puca chilea		

Knol vorm .. plat, avoort. .. *sp. d. l. v. p.* ..
 sortering .. *leen. mooi.* ..
 schilkleur .. *geel.* ..
 vleeskleur .. *geel.* ..
 ogen .. *ly. d. v. p.* .. aant. .. *matig.* .. verdeling .. *voor. top* ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. *3.50.* ..
 P₂O₅ zetm. ..
 Koolhydr. ..
 R. E. ..
 Vitamine C ..
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm sortering ..

Resistentie .. Phytophthora blad ..
 - .. knol ..

Wratziekte .. D G ..
 Fusarium Rhizoctonia ..
 Alternaria Schurft ..
 Bladrol Virus X ..
 Virus S Y Mozaiek ..
 Aard. moeheid Colorado kever ..
 Kringrigheid inw. knolgebr. ..
 Vorst ..

Kookeigenschappen .. smaak ..
 geur vezel ..
 bloemigh. kleur ..

Stengel aant. stevigh. ..
 kleur
 vleugels stipulae ..

Blad jukken stand kleur ..
 stip samenst. ..
 beharing dikte ..
 vorm blaadjes tussenbl. ..
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze periode ..
 stengel stipulae ..

Bloem stengel geleding ..
 diam. vorm kleur ..
 androec. stijl ..
 stuifmeel sp. bessen ..
 besvorm aant. zaden ..

Kruisbaarheid

by ontvangst. hout S. smaak Y. geel X = blad.

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
290	Kaueia 53	Reinosa	Reinosa		

Knol vorm . Rond . . . in . plaat . naast . de . mangel . mat .
 sortering by . foent .
 schilkleur paars . violet . met . paars . v. . stek .
 vleeskleur licht . geel .
 ogen . d. p . breed . . aant . . by . veel . . verdeling . by . versde .
 rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
 O. W. G. 355 .
 P₂O₅ zetm. 0.23 .
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia . a
 Alternaria Schurft . 0
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by ontvansst. comb. S. Y. see X en blad

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
291	Kcaia 54		Puca Huayauru		

Knol vorm . *brood*
 sortering . *nov?*
 schilkleur . *paars w. r. f. d. v. d. e. z. g. alba. i. f. d. e. d. e. l*
 vleeskleur . *z. g. e. e. l*
 ogen . *v. l. a. h.* aant. *w. e. i. n. i. g.* verdeling . *v. o. n. a. l. h. o. p.*
 rustperiode

Chem. samenst. 19⁵⁵ 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm. *0.25*
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad *wech*
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia *l.*
 Alternaria Schurft *d. e. h.*
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid *n. a. l. p. a. a. r.* Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by ontbrangst geen virus onderzoek

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
292	Keara 55a				

Knol vorm . een langwerpige wortvormig. gebogen
 sortering . mooi
 schilkleur . geel met rose doorschijnend
 vleeskleur . geel
 ogen . vlak . . . aant. . bij voort. . verdeling . een verspreid
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. 335
 P₂O₅ zetm. 0.21
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia . 0
 Alternaria Schurft . w
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by ontwerp van vms anders veld.

Nummer 293 verzameld onder de benaming Keaia 556
Groeiplaats inheemse naam Solanum 2n=

Knol vorm . b. v. o. o. l.
sortering . ja. e. n. l.
schilkleur . geel
vleeskleur . wit. e. s. t.
ogen . l. y. v. l. a. g. aant. ind. l. y. verdeling . l. y. v. a. n. d. e. l. e. d. .
rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
O. W. G.
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
- knol

Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia . i. b.
Alternaria Schurft . o.
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid Colorado kever
Kringrigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
geur vezel
bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
kleur
vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
stip samenst.
beharig dikte
vorm blaadjes tussenbl.
opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
stengel stipulae

Bloem stengel geleding
diam. vorm kleur
androec. stijl
stuifmeel sp. bessen
besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid
.
.
.
.
.

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
294	Kearia 56				

Knol vorm . *brood*
 sortering *groet*
 schilkleur *dupaars violet*
 vleeskleur *2. gele violet vaat. b. wit*
 ogen *plak* aant. *ing. veel* . verdeling *zeer verspreid*
lange werkb.
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G. *496*
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft *ich.*
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid *patboer* Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by uitgangst. fce virus onderzoek

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
295	Yabar 3	Pau carombo	van maraya vriest resistent.		

<u>Knol vorm</u>					
sortering					
schilkleur					
vleeskleur					
ogen	aant.				verdeling
rustperiode					
<u>Chem. samenst.</u>	19	19	19	19	19
O. W. G.					
P ₂ O ₅ zetm.					
Koolhydr.					
R. E.					
Vitamine C					
Solanine					
<u>Zetm. korrelvorm</u>	sortering				
<u>Resistentie</u>	Phytophthora blad				
	- knol				
Wratziekte	D				G
Fusarium	Rhizoctonia				
Alternaria	Schurft				
Bladrol	Virus X				
Virus S	Y			Mozaiek	
Aard. moeheid	Colorado kever				
Kringerigheid	inw. knolgebr.				
Vorst					

<u>Kookeigenschappen</u>	smaak				
geur	vezel				
bloemigh.	kleur				
<u>Stengel aant.</u>	stevigh.				
kleur					
vleugels	stipulae				
<u>Blad jukken</u>	stand	kleur			
stip	samenst.				
beharing	dikte				
vorm blaadjes	tussenbl.				
opvulling bl. oppervlak					
<u>Bloeiwijze</u>	periode				
stengel	stipulae				
<u>Bloem stengel</u>	geleding				
diam.	vorm				kleur
androec.	stijl				
stuifmeel	sp. bessen				
besvorm	aant. zaden				
<u>Kruisbaarheid</u>					

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
296	de benaming Yaban 4	Dauca Tombo			

Knol vorm . Rond
 sortering
 schilkleur . Rosepaars . feel van de top
 vleeskleur
 ogen aant. verdeling
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
297	Jakar g	Pancarombo			

Knol vorm
 sortering
 schilkleur
 vleeskleur
 ogen aant. verdeling
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
298	de benaming Lima 1	Markt Lima			

Knol vorm .. Ovaal
 sortering .. n.g. goed
 schilkleur .. rose paars
 vleeskleur .. wit
 ogen .. n.g. vlak. aant. .. matig .. verdeling .. n.g. verdeeld
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. .. 21.9 (10)
 P₂O₅ zetm. .. 0.26
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C ..
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie .. Phytophthora blad ..
 .. - knol ..

Wratziekte .. D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia iels.
 Alternaria .. Schurft 0.
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. vatbaar .. Colorado kever ..
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ..
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..
 geur .. vezel ..
 bloemigh. .. kleur ..
Stengel aant. .. stevigh. ..
 kleur ..
 vleugels .. stipulae ..
Blad jukken .. stand .. kleur ..
 stip .. samenst. ..
 beharing .. dikte ..
 vorm blaadjes .. tussenbl. ..
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..
 stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..
 diam. .. vorm .. kleur ..
 androec. .. stijl ..
 stuifmeel .. sp. bessen ..
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..
 ..
 ..
 ..
 ..

by ontvangst bml. X.S. for Y & Knol

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
296	de benaming Lima 2	Markt Lima			

Knol vorm *ronde-voal*

sortering

schilkleur *geel. v. v. doorschijnend. paars. om g. v.*

vleeskleur *elg.*

ogen *v. v.* aant. *matig* verdeling *v. v. v.*

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia

Alternaria Schurft

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid Colorado kever

Kringrigheid inw. knolgebr.

Vorst

by ontvangst bond. X. S. see of Knol

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
297 306	Lima 3	Markt Lima			

Knol vorm .. *ovaal langwerp.*
 sortering .. *ly. goed.*
 schilkleur .. *roze geel.*
 vleeskleur .. *2. geel.*
 ogen .. *ly. diep.* aant. .. *ly. veel.* verdeling .. *aan verspreid*
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. *309 k.*
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad ..
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia ..
 Alternaria .. Schurft ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. *natbaan* .. Colorado kever ..
 Kringrigheid .. inw. knolgebr.
 Vorst

ly. struik. hart X. S. geen Y. blut

Kookeigenschappen smaak ..

geur .. vezel ..
 bloemigh. kleur ..

Stengel aant. .. stevigh.

kleur ..
 vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..

stip .. samenst.
 beharing .. dikte ..
 vorm blaadjes .. tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..

stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..

diam. vorm .. kleur ..
 androec. stijl ..
 stuifmeel .. sp. bessen ..
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..