

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
902	Pan 54 Ochoa 328.04-1-51	coll Ochoa			

Knol vorm .. rond.....
sortering .. weinig. vryf. knollen.....
schilkleur .. geel. met een l. bl. r. in de kop.....
vleeskleur wit.....
ogen .. vry vlak. aant. .. vry veel. verdeling .. vry verspreid
rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
P₂O₅ zetm. 0.20.....
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad. *matig*.....
- knol.....

Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia
Alternaria Schurft
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid Colorado kever
Kringrigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
geur vezel
bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
kleur
vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
stip samenst.
beharig dikte
vorm blaadjes tussenbl.
opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
stengel stipulae

Bloem stengel geleding
diam. vorm kleur
androec. stijl
stuifmeel sp. bessen
besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
906	de benaming Peru 50 Ochoa 414.320-6-51	coll Ochoa		Andifanum	

Knol vorm .. Rond. - ..
 sortering .. mon ..
 schilkleur .. groen ..
 vleeskleur
 ogen .. diep .. aant. .. wj. verd. .. verdeling .. wj. verspreid ..
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm. D. 4/10 ..
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid - Colorado kever
 Kringerigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid J. L.
 Libertas

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
900	Penn 60 Ochoa C. V. C 811-1-47	coll. Ochoa			

Knol vorm .. Rond ..
 sortering .. veel. v. klein knolle ..
 schilkleur .. geel. .. sours. v. b. .. lippen. aan d. b. top ..
 vleeskleur .. afgeel ..
 ogen .. v. diep .. aant. .. matig .. verdeling .. v. verspreid ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad ..
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia ..
 Alternaria .. Schurft ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. Colorado kever ..
 Kringrigheid .. inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak ..
 geur .. vezel ..
 bloemigh. kleur ..

Stengel aant. .. stevigh.
 kleur ..
 vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..
 stip .. samenst.
 beharing .. dikte ..
 vorm blaadjes .. tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..
 stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..
 diam. vorm .. kleur ..
 androec. stijl ..
 stuifmeel .. sp. bessen ..
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
914	Malinae	uit Rusland verkeerd 1956		?	

Knol vorm
 sortering
 schilkleur
 vleeskleur
 ogen
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
916	de benaming Mombasa	midde Java	kentang mombasa	tuberosum	

Knol vorm
 sortering
 schilkleur
 vleeskleur
 ogen
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

D. ginschkei *redelgk. goed. resistentie*

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae
Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid *met vele tuberosum samen*

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
917	Kentang wuluh	Ngodijari Boal Jawa	Kentang wuluh	Andapan	

Knol vorm . rond

sortering

schilkleur . roodpaars

vleeskleur . geel

ogen . ^{ing. diep} ing. _{ing. vlak} aant. ing. vert. verdeling . ^{verspreid} verspreid

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia

Alternaria Schurft +

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid Colorado kever

Kringerigheid inw. knolgebr.

Vorst

Hyusichk. ?

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
919	de benaming Kantong Wulung}	Ngadisari Oost Java	Kantong Wulung		

Knol vorm . rond

sortering

schilkleur . paars rood

vleeskleur . lg - geel

ogen ^{in deel} vrij diep aant. ^{matig} verdeling ^{aan de knop}

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia

Alternaria Schurft a

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid Colorado kever

Kringrigheid inw. knolgebr.

Vorst

Olymische?

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
920	Kantong Walung	Ngadisan	Kantong Walung		

Knol vorm .. wort. - ovaal ..
 sortering ..
 schilkleur .. paars. wort.
 vleeskleur .. lj. - geel ..
 ogen ^{in diep} .. aant. .. matig .. verdeling .. verspreid.
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm .. sortering ..
Resistentie Phytophthora blad ..
 - knol ..
 Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia ..
 Alternaria .. Schurft. + ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. Colorado kever ..
 Kringrigheid .. inw. knolgebr.
 Vorst ..
 slymsiekt.

Kookeigenschappen smaak ..
 geur .. vezel ..
 bloemigh. kleur ..
Stengel aant. .. stevigh.
 kleur ..
 vleugels .. stipulae ..
Blad jukken .. stand .. kleur ..
 stip .. samenst.
 beharing .. dikte ..
 vorm blaadjes .. tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..
 stengel .. stipulae ..
Bloem stengel .. geleding ..
 diam. vorm .. kleur ..
 androec. stijl ..
 stuifmeel .. sp. bessen ..
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..
 ..
 ..
 ..
 ..

Nummer

921

verzameld onder

de benaming

hentang wuling
5

Groeiplaats

Agadinari

inheemse naam

hentang wuling

Solanum

2n=

Knol vorm .. *ronde, roest.*

sortering

schilkleur .. *paarsrood*

vleeskleur .. *lg. geel*

ogen *ingedropt* .. aant. .. *matig* .. verdeling .. *verspreid*

in blad rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm

sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D

G

Fusarium

Rhizoctonia

Alternaria

Schurft *o*

Bladrol

Virus X

Virus S

Y

Mozaiek

Aard. moeheid

Colorado kever

Kringrigheid

inw. knolgebr.

Vorst

dynamische

Kookeigenschappen smaak

geur

vezel

bloemigh.

kleur

Stengel aant.

stevigh.

kleur

vleugels

stipulae

Blad jukken

stand

kleur

stip

samenst.

beharig

dikte

vorm blaadjes

tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze

periode

stengel

stipulae

Bloem stengel

geleding

diam.

vorm

kleur

androec.

stijl

stuifmeel

sp. bessen

besvorm

aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
922	de benaming Kantang Wulung 6	Ngadisari	Kantang Wulung		

Knol vorm . rond . ovaal

sortering

schilkleur . paars

vleeskleur . fel

ogen aant. verdeling

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia

Alternaria Schurft +

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid Colorado kever

Kringrigheid inw. knolgebr.

Vorst

Agrostis

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
923	de benaming Kantang waling H	Ngadisari	Kantang waling		

Knol vorm .. rond: avaal ..
 sortering ..
 schilkleur .. paars rood ..
 vleeskleur .. geel: geel ..
 ogen ^{op vlak} .. aant. .. matig .. verdeling .. verspreid ..
 rustperiode ^{in diep} ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad ..
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia ..
 Alternaria .. Schurft + ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. Colorado kever ..
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ..
 Vorst ..

Alymsicht

Kookeigenschappen smaak ..
 geur .. vezel ..

bloemigh. kleur ..

Stengel aant. .. stevigh.
 kleur ..

vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..

stip .. samenst.

beharig .. dikte ..

vorm blaadjes .. tussenbl.

opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..

stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..

diam. vorm .. kleur ..

androec. stijl ..

stuifmeel .. sp. bessen ..

besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
925	Kentang wuling 9	Ngadisaeri	Kentang wuling		

Knol vorm .. rond. oval. (weinig. klein knoll.
 sortering
 schilkleur .. paars-wit
 vleeskleur .. geel. wit. violet. bank. vbr
 ogen ^{in vlak} _{in diep} .. aant. .. matig .. verdeling .. verspreid
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft. *
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst
 dynamisch

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
926	Ochoa 1417 zaad				
<u>Knol vorm</u>				<u>Kookeigenschappen</u>	smaak
sortering				geur	vezel
schilkleur				bloemigh.	kleur
vleeskleur				<u>Stengel aant.</u>	stevigh.
ogen	aant.	verdeling		kleur	
rustperiode				vleugels	stipulae
<u>Chem. samenst.</u>	19	19	19	19	19
O. W. G.				<u>Blad jukken</u>	stand
P ₂ O ₅ zetm.				stip	samenst.
Koolhydr.				beharing	dikte
R. E.				vorm blaadjes	tussenbl.
Vitamine C				opvulling bl. oppervlak	
Solanine				<u>Bloeiwijze</u>	periode
<u>Zetm. korrelvorm</u>		sortering		stengel	stipulae
<u>Resistentie</u>	Phytophthora	blad		<u>Bloem stengel</u>	geleding
	-	knol		diam.	vorm
Wratziekte	D		G	androec.	stijl
Fusarium		Rhizoctonia		stuifmeel	sp. bessen
Alternaria		Schurft		besvorm	aant. zaden
Bladrol		Virus X		<u>Kruisbaarheid</u>	
Virus S	Y	Mozaiek			
Aard. moeheid		Colorado kever			
Kringerigheid		inw. knolgebr.			
Vorst					

Nummer

935927

verzameld onder

de benaming

Ochoa 2035
Land

Groeiplaats

inheemse naam

Solanum

lycopersiconides

2n=

Knol vorm

sortering

schilkleur

vleeskleur

ogen aant. verdeling

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia

Alternaria Schurft

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid Colorado kever

Kringerigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer

928

verzameld onder
de benaming

Ochsa 2062
Land

Groeiplaats

inheemse naam

Solanum

2n=

Knol vorm

sortering

schilkleur

vleeskleur

ogen aant. verdeling

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia

Alternaria Schurft

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid Colorado kever

Kringerigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

behaving dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
929	Hyerling 9 65 Lood	Juzuy N. Argentinië 1953		infundib. liforme	

Knol vorm
 sortering
 schilkleur
 vleeskleur
 ogen aant. verdeling
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
939	<i>Syerling</i> 351-452. C. P. C. 24 06 (road)			<i>Konlei</i>	
<u>Knol vorm</u>				<u>Kookeigenschappen</u>	smaak
sortering				geur	vezel
schilkleur				bloemigh.	kleur
vleeskleur				<u>Stengel aant.</u>	stevigh.
ogen	aant.		verdeling	kleur	
rustperiode				vleugels	stipulae
<u>Chem. samenst.</u>	19	19	19	19	19
O. W. G.				<u>Blad jukken</u>	stand
P ₂ O ₅ zetm.				stip	samenst.
Koolhydr.				beharing	dikte
R. E.				vorm blaadjes	tussenbl.
Vitamine C				opvulling bl. oppervlak	
Solanine				<u>Bloeiwijze</u>	periode
<u>Zetm. korrelvorm</u>			sortering	stengel	stipulae
<u>Resistentie</u>	Phytophthora	blad		<u>Bloem stengel</u>	geleding
	-	knol		diam.	vorm
Wratziekte	D		G	androec.	stijl
Fusarium			Rhizoctonia	stuifmeel	sp. bessen
Alternaria			Schurft	besvorm	aant. zaden
Bladrol			Virus X	<u>Kruisbaarheid</u>	
Virus S		Y	Mozaiek		
Aard. moeheid			Colorado kever		
Kringerigheid			inw. knolgebr.		
Vorst					

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
930	Herbarium 351 E.P.C. 2487 aad	Tileara, Japan Bogantani			
<u>Knol vorm</u>				<u>Kookeigenschappen</u>	smaak
sortering				geur	vezel
schilkleur				bloemigh.	kleur
vleeskleur				<u>Stengel aant.</u>	stevigh.
ogen	aant.	verdeling		kleur	
rustperiode				vleugels	stipulae
<u>Chem. samenst.</u>	19	19	19	19	19
O. W. G.				<u>Blad jukken</u>	stand
P ₂ O ₅ zetm.				stip	samenst.
Koolhydr.				beharing	dikte
R. E.				vorm blaadjes	tussenbl.
Vitamine C				opvulling bl. oppervlak	
Solanine				<u>Bloeiwijze</u>	periode
<u>Zetm. korrelvorm</u>		sortering		stengel	stipulae
<u>Resistentie</u>	Phytophthora	blad		<u>Bloem stengel</u>	geleding
	-	knol		diam.	vorm
Wratziekte	D		G	androec.	stijl
Fusarium		Rhizoctonia		stuifmeel	sp. bessen
Alternaria		Schurft		besvorm	aant. zaden
Bladrol		Virus X		<u>Kruisbaarheid</u>	
Virus S	Y	Mozaiek			
Aard. moeheid		Colorado kever			
Kringerigheid		inw. knolgebr.			
Vorst					

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
932	Hgerling 351. 1952 C.P.C. 24 00	Tilcara, Jujuy Argentina		Verna v. Balsini	
<u>Knol vorm</u>				<u>Kookeigenschappen</u>	smaak
sortering				geur	vezel
schilkleur				bloemigh.	kleur
vleeskleur				<u>Stengel aant.</u>	stevigh.
ogen	aant.	verdeling		kleur	
rustperiode				vleugels	stipulae
<u>Chem. samenst.</u>	19	19	19	19	19
O. W. G.				<u>Blad jukken</u>	stand
P ₂ O ₅ zetm.				stip	samenst.
Koolhydr.				beharing	dikte
R. E.				vorm blaadjes	tussenbl.
Vitamine C				opvulling bl. oppervlak	
Solanine				<u>Bloeiwijze</u>	periode
<u>Zetm. korrelvorm</u>		sortering		stengel	stipulae
<u>Resistentie</u>	Phytophthora	blad		<u>Bloem stengel</u>	geleding
	-	knol		diam.	vorm
Wratziekte	D		G	androec.	stijl
Fusarium		Rhizoctonia		stuifmeel	sp. bessen
Alternaria		Schurft		besvorm	aant. zaden
Bladrol		Virus X		<u>Kruisbaarheid</u>	
Virus S	Y	Mozaiek			
Aard. moeheid		Colorado kever			
Kringerigheid		inw. knolgebr.			
Vorst					

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
933	Ajerling 332, 1952 C.P.C. 2485			spontane hybride van S. vernei?	

Knol vorm

sortering

schilkleur

vleeskleur

ogen aant. verdeling

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia

Alternaria Schurft

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid Colorado kever

Kringerigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
934	Hyertling 970, 1953 A.C.A. H. 18 2001	Yrci. 3450 m dep. Jujuy Argentina		acaule	

Knol vorm
 sortering
 schilkleur
 vleeskleur
 ogen aant. verdeling
 rustperiode

Chem. samenst.	19	19	19	19	19	19
O. W. G.						
P ₂ O ₅ zetm.						
Koolhydr.						
R. E.						
Vitamine C						
Solanine						

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte	D	G
Fusarium		Rhizoctonia
Alternaria		Schurft
Bladrol		Virus X
Virus S	Y	Mozaiek
Aard. moeheid		Colorado kever
Kringrigheid		inw. knolgebr.
Vorst		

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden.

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
935	<i>Hyrtis</i> 1086, 1953 A.C.A. H.19 1953	Peru, San Roman 4200 m Peru		<i>acaule</i>	
<hr/>					
<u>Knol vorm</u>					
sortering					
schilkleur					
vleeskleur					
ogen	aant.	verdeling			
rustperiode					
<u>Chem. samenst.</u>	19	19	19	19	19
O. W. G.					
P ₂ O ₅ zetm.					
Koolhydr.					
R. E.					
Vitamine C					
Solanine					
<u>Zetm. korrelvorm</u>	sortering				
<u>Resistentie</u>	Phytophthora blad				
	- knol				
Wratziekte	D	G			
Fusarium	Rhizoctonia				
Alternaria	Schurft				
Bladrol	Virus X				
Virus S	Y	Mozaiek			
Aard. moeheid	Colorado kever				
Kringerigheid	inw. knolgebr.				
Vorst					
<hr/>					
<u>Kookeigenschappen</u> smaak					
geur					
bloemigh.					
Stengel aant.					
kleur					
vleugels					
stipulae					
Blad jukken					
stand					
kleur					
stip					
samenst.					
behaving					
dikte					
vorm blaadjes					
tussenbl.					
opvulling bl. oppervlak					
<u>Bloeiwijze</u>					
periode					
stengel					
stipulae					
<u>Bloem stengel</u>					
geleding					
diam.					
vorm					
kleur					
androec.					
stijl					
stuifmeel					
sp. bessen					
besvorm					
aant. zaden.					
<u>Kruisbaarheid</u>					

Nummer

936

verzameld onder
de benaming
Hynting 1341, 1453
A.C.A. H. 20
20-nd

Groeiplaats
Tanna Casaraca
3850 m
Peru

inheemse naam

Solanum
acaule

2n=

Knol vorm
sortering
schilkleur
vleeskleur
ogen aant. verdeling
rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
- knol

Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia
Alternaria Schurft
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid Colorado kever
Kringrigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
reukgeur vezel
bl. bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
kleur
vleugelugs stipulae

Blad jukken stand kleur
stip stip samenst.
beëeharing dikte
vorm blaadjes tussenbl.
opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
stengel stipulae

Bloem stengel geleding
diam. vorm kleur
androec. stijl
stuiifmeel sp. bessen
besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
934	Stjerling 1409, 1953 A.C.A. H.21 Lam	Cangallo dept. Ayacucho 3900 m. Peru		acaule	

Knol vorm
 sortering
 schilkleur
 vleeskleur
 ogen aant. verdeling
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
938	Nyenting 1410, 1953 A.C.A. H.50 2000	Cangallo dept. Ayacucho 3900		acaule	
<u>Knol vorm</u>				<u>De Kookeigenschappen</u>	smaak
sortering				geur	vezel
schilkleur				bloembloemigh.	kleur
vleeskleur				<u>Stengel</u> aant.	stevigh.
ogen	aant.	verdeling		kleur	
rustperiode				vleugels	stipulae
<u>Chem. samenst.</u>	19	19	19	19	19
O. W. G.				<u>Blad</u> Bladlukken	stand
P ₂ O ₅ zetm.				stip	kleur
Koolhydr.				stip	samenst.
R. E.				beharing	dikte
Vitamine C				vorm	tussenbl.
Solanine				opvulling	oppervlak
<u>Zetm. korrelvorm</u>				<u>Bloeiwijze</u>	periode
<u>Resistentie</u>	Phytophthora	blad		stengel	stipulae
	-	knol		<u>Bloem</u> stengel	geleding
Wratziekte	D	G		diam.	vorm
Fusarium		Rhizoctonia		androec.	stijl
Alternaria		Schurft		stuijmeel	sp. bessen
Bladrol		Virus X		bessvorm	aant. zaden
Virus S	Y	Mozaiek		<u>Kruisbaarheid</u>	
Aard. moeheid		Colorado kever			
Kringgerigheid		inw. knolgebr.			
Vorst					

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
940	Njerting, 1837, 1953 N.H.K. H. 30 zaad	La Oroya 3750m Tanna Fenu		meschawkesii	

Knol vorm
 sortering
 schilkleur
 vleeskleur
 ogen aant. verdeling
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden.

Kruisbaarheid

Nummer

942

verzameld onder
de benaming

Herting 1420, 1953
P.A.M. H. 40. 2aad

Groeiplaats

Ayacueho
Cangallo, Pajonal
2000 m

inheemse naam

Solanum

sampsonae

2n=

Knol vorm

sortering

schilkleur

vleeskleur

ogen aant. verdeling

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia

Alternaria Schurft

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid Colorado kever

Kringerigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

behaving dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden.

Kruisbaarheid

Nummer

993

verzameld onder
de benaming

Opw. 1521, 1953
RAP. H. 20
2001

Groeiplaats

Saxahuaman
Cusco 3450 m

inheemse naam

Solanum

raphanifolium

2n= 24

Knol vorm

sortering

schilkleur

vleeskleur

ogen aant. verdeling

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia

Alternaria Schurft

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid Colorado kever

Kringrigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

behaving dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer

944

verzameld onder
de benaming

Sperting 350
C.P.C. 2401
don

Groeiplaats

Tilcara
Argentina

inheemse naam

Solanum
simplexifolium

2n= 24

Knol vorm

sortering

schilkleur

vleeskleur

ogen aant. verdeling

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia

Alternaria Schurft

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid Colorado kever

Kringrigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer

945

verzameld onder

de benaming

H. Sleumer 3786

g. w. l. e.
TAR. H. 57

Groeiplaats

Salta, Santa Victoria

2400 m.

inheemse naam

Solanum

taripense

2n=

Knol vorm

sortering

schilkleur

vleeskleur

ogen aant. verdeling

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia

Alternaria Schurft

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid Colorado kever

Kringrigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer

946

verzameld onder
de benaming

H. Sleumer 4024
TAR. H. 50

Groeiplaats

Salta Santa Victoria
Bepantani
2450 m

inheemse naam

Solanum

tarjense

2n=

Knol vorm
 sortering
 schilkleur
 vleeskleur
 ogen aant. verdeling
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

behaving dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer

947

verzameld onder
de benaming

Hertling 1527. 1953
200 WLD, H-34

Groeiplaats

Pisac. Cuzco
3350m
Peru

inheemse naam

Solanum

und.

2n=

Knol vorm

sortering

schilkleur

vleeskleur

ogen aant. verdeling

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia

Alternaria Schurft

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid Colorado kever

Kringrigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden.

Kruisbaarheid

Nummer

940

verzameld onder
de benaming

Hjerling, 962, 1953
WLD. H. 35 (aan)

Groeiplaats

Huachuca
Zujuy Arj.
3000 m

inheemse naam

Solanum

wild

2n=

Knol vorm

sortering

schilkleur

vleeskleur

ogen aant. verdeling

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia

Alternaria Schurft

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid Colorado kever

Kringrigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden.

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
949	Hyerling 1051 W.L.D. H. 36	Murillo, La Paz 3500 m Bolivia		mls	

Knol vorm
 sortering
 schilkleur
 vleeskleur
 ogen aant. verdeling
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden.

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
951	Njering 1407. 1953 W.L.D. H-49 2001	Campallo Ayacucho 3700 m.		urld	

Knol vorm
 sortering
 schilkleur
 vleeskleur
 ogen aant. verdeling
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden.

Kruisbaarheid

